

**Rozmieszczenie biegacza Ulricha *Carabus ulrichii* (Coleoptera: Carabidae) w Polsce**Distribution of *Carabus ulrichii* (Coleoptera: Carabidae) in PolandADAM BYK<sup>1</sup>, TOMASZ GAZUREK<sup>1</sup>, ADAM WOŹNIAK<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Katedra Ochrony Lasu i Ekologii  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
02–776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159/34  
e-mail: adam\_byk@sggw.pl, togaspain@wp.pl

<sup>2</sup> 02–115 Warszawa, ul. Okińskiego 10/48  
e-mail: isotomus@tlen.pl

**Słowa kluczowe:** Coleoptera, Carabidae, *Eucarabus*, *Carabus ulrichii*, rozmieszczenie, biologia, ochrona, Polska.

Biegacz Ulricha *Carabus* (*Eucarabus*) *ulrichii* Germar, 1824 jest chrząszczem z rodziny biegaczowatych (Carabidae), objętym w naszym kraju ochroną częściową. Występuje w południowej części Polski najliczniej zasiedlając Karpaty, od Beskidu Zachodniego po Bieszczady, skąd niekiedy wraz z wodami wezbraniowymi Sanu, Wisły i Odry zawlekany jest na północ. Poza pogórzem i górami często występuje na Poniżiu oraz w okolicach Ojcowa, Sandomierza i Rzeszowa. Aktualne rozmieszczenie biegacza Ulricha obejmuje 81 krajowych stanowisk, w tym 29 nowych. Chrząszcza wykazano po raz pierwszy na Wyżynie Lubelskiej (z Janiszowa koło Zawichostu), skąd nie był wcześniej podawany. Spotykany jest najczęściej w maju i sierpniu na łąkach, ugorach i w zaroślach na glebach gliniastych, marglistych oraz wapiennych, w pobliżu potoków i rzek, a także w środowiskach ruderalnych. Nie unika starych lasów, w których zamieszkuje luki, polany i ich obrzeża. Obecności biegacza Ulricha nie sprzyja zaniechanie tradycyjnego wykaszania łąk w pobliżu dużych rzek oraz spadek liczby ugorów, małych poletek i miedz.