

Nowe stanowisko linderni mułowej *Lindernia procumbens* na Śląsku Opolskim

The new locality of *Lindernia procumbens* on the Opole Silesia (SW Poland)

KRZYSZTOF SPAŁEK

*Pracownia Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej
Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski
45–052 Opole, ul. Oleska 22
e-mail: kspalek@uni.opole.pl*

Słowa kluczowe: gatunki namułkowe, rozmieszczenie, stawy hodowlane, południowo-zachodnia Polska.

Lindernia mułowa *Lindernia procumbens* (Krocker) Philcox jest rośliną roczną, pojawiającą się w lipcu, kwitnie i owocuje w sierpniu, kończy rozwój późną jesienią wraz z pierwszymi przymrozami. W Polsce występuje ona bardzo rzadko na rozproszonych stanowiskach, skupionych głównie w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz w dorzeczu górnej Wisły, w miejscach wilgotnych, mulistych lub piaszczystych, na brzegach obu rzek i ich starorzeczy, a także na dnie wysychających stawów hodowlanych, w zbiorowiskach namułkowych z klasy *Isoëto-Nanojuncetea*. Nowe stanowisko tego gatunku stwierdzono w 2015 roku na dnie wyschniętego stawu hodowlanego w Gąsiorowicach koło Strzelec Opolskich na Śląsku Opolskim.