

Nowe stanowiska gruszycki karpackiej *Pyrola carpatica* w Tatrzańskim Parku Narodowym

New localities of *Pyrola carpatica* in the Tatra National Park

ANNA WRÓBEL¹, SŁAWOMIR WRÓBEL²

¹ e-mail: anna.monika.wrobel@student.uj.edu.pl

² Tatrzański Park Narodowy
34–500 Zakopane, Kuźnice 1
e-mail: swrobel@tpn.pl

Słowa kluczowe: gruszycka karpacka, *Pyrola carpatica*, Tatry, murawy wysokogórskie, endemit karpacki.

Celem pracy jest przedstawienie nowo odnalezionych stanowisk gruszycki karpackiej *Pyrola carpatica* Holub et Křisa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – ośmiu zlokalizowanych w masywie Czerwonych Wierchów oraz dziewiętego w masywie Kominiarskiego Wierchu, skąd gatunek nie był wcześniej podawany. Na powyższych stanowiskach gruszycka karpacka rośnie w *Festuco versicoloris*-*Seslerietum tatrae*, *Caricetum firmae* oraz, rzadko, w zbiorowisku przejściowym między *Festuco*-*Seslerietum* a traworoślem *Festucetum carpaticae*. Zgromadzone dane wskazują, że populacja gruszycki karpackiej w polskich Tatrach Zachodnich jest liczniejsza, niż dotychczas sądzono. Łącznie zanotowano kilkaset pędów generatywnych, co pozwala na obniżenie stopnia zagrożenia tego gatunku z kategorii EN do VU.