

Bocian biały *Ciconia ciconia* w powiecie bydgoskim w latach 2013–2014. Stan aktualny i zmiany

White Stork *Ciconia ciconia* in Bydgoszcz district in 2013–2014. Current status and changes

ANDRZEJ DYLIK

85–435 Bydgoszcz, ul. Kotwiczowa 15
e-mail: andrzejdylik@wp.pl

Słowa kluczowe: monitoring ptaków, bydgoskie, liczebność, sukces lęgowy.

W pracy przedstawiono wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie bydgoskim w latach 2013 i 2014 oraz dane z lat wcześniejszych z części powiatu. Liczba par lęgowych (HPa) w latach 2013 i 2014 wynosiła 114 i 119, a zagęszczenie – odpowiednio 8,17 i 8,53 pary/100 km². Liczba par lęgowych była niższa niż podawana podczas ogólnopolskiego spisu w roku 2004, jednak analiza liczebności na dobrze zbadanych powierzchniach referencyjnych nie potwierdza tego trendu w tak dużym rozmiarze. Udział par bez odchowanych młodych (%HPo) wynosił od 8% (2014 r.) do 23% (2012 r.). W latach 2004–2014 średnia liczba wyprowadzonych młodych na parę z sukcesem lęgowym (JZm) i na parę z zajęтым gniazdem (JZa) wynosiła odpowiednio 2,38–3,00 (średnio 2,71) oraz 1,89–2,51 (średnio 2,34). Stwierdzono, że w 2014 roku 92,4% gniazd było umiejscowionych na słupach, głównie energetycznych, 4,2% na kominach, a po 1,7% na dachach i drzewach. Ponad 84% zajętych gniazd ulokowanych było na słupach z zainstalowanymi na nich platformami.