

Stanowisko tajeży jednostronnej *Goodyera repens* na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Kotlina Sandomierska)

The site of *Goodyera repens* in the Kolbuszowa Plateau
(the Sandomierz Basin)

ANDRZEJ WOJTAN¹, MARCIN MAGIERSKI², ŁUKASZ KUBEJKO³

¹ Katedra Biologii Środowiska

² Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin

Uniwersytet Rzeszowski

35–959 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4

e-mail: wojtan@univ.rzeszow.pl, marcin_magierski@o2.pl

³ 37–511 Wólka Pełkińska, Kostków 38

e-mail: szpaklyk@interia.eu

Słowa kluczowe: *Goodyera repens*, Kotlina Sandomierska, Płaskowyż Kolbuszowski, rozmieszczenie.

Tajeża jednostronna *Goodyera repens* (L.) R. Br. jest storczykiem rzadko notowanym w Kotlinie Sandomierskiej. W roku 2012 odkryto bogate stanowisko tego gatunku na Płaskowyżu Kolbuszowskim, skąd tajeża nie była dotychczas podawana. Stwierdzono wówczas około 600 osobników tego gatunku, w tym 90 kwitnących. Rok później odnotowano na stanowisku około 50 kwitnących osobników z podobnym udziałem rozet jak w roku 2012. Potencjalnym zagrożeniem dla tej populacji może być wydeptywanie, buchtowanie ściółki przez dziki oraz prace gospodarcze w lesie.