

Popielicowate (Gliridae) Ślęzańskiego Parku Krajobrazowego

Dormice (Gliridae) of Ślęza Landscape Park

KATARZYNA TRZOP, MAGDALENA MOSKA

Katedra Genetyki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

51–631 Wrocław, ul. Kozuchowska 7

e-mail: magdalena.moska@up.wroc.pl

Słowa kluczowe: popielicowate, Gliridae, popielica, orzesznica, koszatka, Masyw Ślęży.

Celem przeprowadzonych w latach 2010 i 2011 badań była inwentaryzacja ssaków popielicowatych (Gliridae), występujących w Masywie Ślęży na Przedgórzu Sudeckim. Rejestrowano obecność osobników dorosłych i młodych oraz wszelkie ślady ich bytowania: gniazda, włosy, ślady żerowania, odgłosy. Przeprowadzono także wywiady z leśniczymi i miejscową ludnością. W Masywie Ślęży wykazano obecność trzech gatunków popielicowatych: popielicy *Glis glis* (na 12 stanowiskach) i orzesznicy *Muscardinus avellanarius* (na 12 stanowiskach) oraz koszatki *Dryomys nitedula* – w pięciu miejscach. Występowanie koszatki stwierdzono na tym terenie po raz pierwszy.