

Występowanie różanki *Rhodeus sericeus* (Pallas, 1776) i piskorza *Misgurnus fossilis* (Linné, 1758) w Puszczy Kampinoskiej

The occurrence of the bitterling *Rhodeus sericeus* (Pallas, 1776) and weatherfish *Misgurnus fossilis* (Linné, 1758) in the Kampinos Forest (Central Poland)

ADAM OLSZEWSKI¹, MICHAŁ GŁÓWKA²

¹Kampinoski Park Narodowy
05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
e-mail: ad.ol@wp.pl

²96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 41 m. 23
e-mail: michalglowka@op.pl

Słowa kluczowe: ryby, różanka, piskorz, Kampinoski Park Narodowy.

Abstrakt: Kampinoski Park Narodowy (KPN) jest położony w województwie mazowieckim w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Lasy zajmują ponad 73%, a wody powierzchniowe tylko 0,23% całkowitej powierzchni parku. Stwierdzono w nich występowanie 23 gatunków ryb, z tego 3 tylko w stawach hodowlanych. Ryby były najsłabiej zbadaną gromadą kręgowców w ciągu 50 lat istnienia KPN. Na ich temat zebrano informacje z publikacji oraz przeprowadzono badania w 2008 roku, w wyniku których stwierdzono występowanie różanki i piskorza na terenie KPN. Celem pracy jest opis występowania gatunków ryb KPN wymienionych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE oraz w *Polskiej czerwonej księdze zwierząt* ze statusem „bliskie zagrożenia”. Wykazano jedno stanowisko różanki w kanale Łasica w miejscowości Karolinów. Natomiast piskorz występował w kanałach: Łasica, Zaborowskim i Wilcza Struga, w stawie parafialnym w Górkach oraz w torfiarkach w Nartach. W ostatnim ćwierćwieczu XX wieku stwierdzany był także w jeziorze Tomczyn oraz w stawie w Sadykierzu. Porównanie wyników składu pokarmowego piskląt bociana czarnego z lat 1985–1987 i 2006–2007 wskazuje na spadek liczebności piskorza w KPN w ciągu ostatnich 20 lat.