

Porosty epifityczne i grzyby naporostowe drzew owocowych w gminie Sławno (Polska Środkowa)

Epiphytic lichens and lichenicolous fungi of fruit trees in the commune of Sławno (Central Poland)

ANNA ŁUBEK*, EWELINA BISKUP

*Instytut Biologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
25–406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
e-mail: alubek@ujk.edu.pl

Słowa kluczowe: epifity, porosty, grzyby naporostowe, drzewa owocowe, różnorodność.

Głównym celem badań prowadzonych w wybranych miejscowościach gminy Sławno było przedstawienie zróżnicowania składu gatunkowego porostów i grzybów naporostowych występujących na korze drzew owocowych (jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie) rosnących w sadach oraz wzdłuż dróg wiejskich. Stwierdzono 47 gatunków porostów oraz 8 grzybów naporostowych. Są wśród nich gatunki nowe dla Polski Środkowej: kropnica sadzona *Bacidia adastrae*, przypróska ochrowa *Piccola ochrophora* oraz trzy grzyby naporostowe – *Cornutispora lichenicola*, *Lichenochora obscuroides* i *Xanthoriicola physciae*. Stwierdzono bogatszą biotę porostów i grzybów naporostowych na drzewach owocowych rosnących w sadach, a uboższą na drzewach owocowych rosnących wzdłuż dróg. Jabłonie i grusze wyróżniają się bogatszą biotą w stosunku do śliw i wiśni.