

Obserwacje przelotów błotniaków: stawowego *Circus aeruginosus* i łąkowego *Circus pygargus* na Wyżynie Krakowskiej

Observations of migratory passages of the Marsh Harrier *Circus aeruginosus* and the Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Kraków Upland (S Poland)

MACIEJ TURZAŃSKI

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
31–016 Kraków, ul. Sławkowska 17
e-mail: turzanski@isez.pan.krakow.pl

Słowa kluczowe: błotniaki, *Circus aeruginosus*, *C. pygargus*, przeloty, Wyżyna Krakowska.

W środkowej części Wyżyny Krakowskiej w latach 2005–2010 rejestrowano obecność błotniaków *Circus* sp. Powierzchnia próbna obejmowała 230,5 km², w tym ważne dla błotniaków tereny otwarte zajmowały 167,5 km² (tj. 72,7%), a lasy pokrywały 63 km² (tj. 27,3%). Celem pracy było stwierdzenie składu gatunkowego oraz ustalenie statusu odnotowanych błotniaków na Wyżynie Krakowskiej. Oprócz własnych obserwacji w pracy uwzględniono także 6 niepublikowanych stwierdzeń innych autorów z lat 1994–2008. W okresie migracji odnotowano łącznie 28 osobników należących do dwóch gatunków błotniaków: stawowego *Circus aeruginosus* ($N_{\text{obs}} = 18$, $N_{\text{os}} = 20$) i łąkowego *Circus pygargus* ($N_{\text{obs/os}} = 8$). Zdecydowana większość (aż 92%; $N_{\text{obs}} = 24$, $N_{\text{os}} = 26$) wszystkich stwierdzeń dotyczyła ptaków na migracji jesiennej, a tylko 8% ($N_{\text{obs/os}} = 2$) – na wiosennej. Nie zarejestrowano stanowisk lęgowych ani platform noclegowych. Zwrócono uwagę na rzeczywiste i potencjalne zagrożenia dla tej grupy ptaków szponiastych na omawianym obszarze.