

Pierwsze stanowiska lęgowe żołą *Merops apiaster* na Opolszczyźnie

The first breeding sites of bee-eaters *Merops apiaster* in the region of Opole Silesia

ROMUALD CISAŁOWSKI¹, DARIUSZ SZŁAMA², HENRYK KOŚCIELNY³

¹ 48–303 Nysa, Domaszkowice 94

e-mail: romcisak@gmail.com

² 44–100 Gliwice, ul. Grottgera 19a/9

e-mail: dapp@poczta.onet.pl

³ 42–609 Tarnowskie Góry, ul. Armii Krajowej 16/38

e-mail: hko7@interia.pl

Słowa kluczowe: żołą, *Merops apiaster*, Opolszczyzna, stanowiska lęgowe.

W drugiej połowie XX wieku w Polsce zasięg występowania żołą *Merops apiaster* był ograniczony głównie do terenu południowo-wschodniej części kraju. W ostatnich latach pojawiły się nowe izolowane stanowiska m.in. koło Oławy i na Przedgórzu Sudeckim na Dolnym Śląsku. Górny Śląsk z Opolszczyzną pozostawały niezasiedlone przez ten gatunek. Wiosną 2008 roku odkryto koło Nysy pierwszą parę budującą norę, a w 2011 roku znaleziono pierwszą czynną kolonię i udokumentowano lęgi tego gatunku niedaleko Baborowa na Opolszczyźnie. W 2011 roku skarpę starej piaskowni zasiedlały 2–3 pary żołą, w 2012 roku – 6 par, a w maju–czerwcu 2013 roku – 4–6 par. W sierpniu 2013 roku niedaleko omawianej kolonii, koło Jędrychowic, obserwowano zgromadzenie 47 dorosłych i lotnych młodych, co może świadczyć o udanych lęgach lokalnej populacji żołą.