

Rukiew wodna *Nasturtium officinale* i szuwar z dominacją rukwi *Nasturtietum officinalis* w źródłach na Śląsku Opolskim*Nasturtium officinale* and *Nasturtietum officinalis* in the springs of Opole Silesia (SW Poland)

KRZYSZTOF SPAŁEK

Zakład Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej
Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski
45–052 Opole, ul. Oleska 22
e-mail: kspalek@uni.opole.pl

Słowa kluczowe: rukiew wodna, *Nasturtium officinale*, szuwar z dominacją rukwi, *Nasturtietum officinalis*, źródła, Śląsk Opolski.

Rukiew wodna *Nasturtium officinale* R. Br. jest rzadkim składnikiem naszej flory i osiąga w kraju kres europejskiego zasięgu. Jej stanowiska są rozproszone w całej Polsce, z wyjątkiem północno-wschodniej części, w większości są to jednak notowania sprzed 1945 roku. Jest gatunkiem charakterystycznym zespołu z dominacją rukwi *Nasturtietum officinalis* Seibert 1962. W Polsce fitocenozy *Nasturtietum officinalis* znane są z bardzo nielicznych stanowisk, notowane były m.in. w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Na Śląsku Opolskim gatunek ten stwierdzono dotychczas na siedmiu stanowiskach. W trakcie badań geobotanicznych prowadzonych na obszarze Śląska Opolskiego w latach 2007–2009 znaleziono 3 nowe stanowiska rukwi wodnej: w źródłach w Rożniątowie, Błotnicy Strzeleckiej i Wolęcinie. Na stanowiskach tych rukiew wodna występowała obficie i tworzyła własny zespół szuwarowy. Zespół ten zajmuje niewielkie powierzchnie, sięgające zazwyczaj od 10 m² do 80 m². Źródła będące na Śląsku Opolskim siedliskiem występowania rukwi wodnej powinny zostać objęte ochroną.