

**Populacja bociana czarnego *Ciconia nigra*
na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2003–2014****The population of the Black Stork *Ciconia nigra*
in the administrative district of Cieszyn in 2003–2014**HENRYK LINERT¹, JADWIGA JAGIEŁKO², JAN KRÓL³, MIROŚLAW WIŚNIEWSKI⁴, ALEKSANDER DORDA⁵¹ 43–400 Cieszyn, ul. L. Brożka 10/5⁴ 43–384 Jaworze, ul. Smrekowa 245² 43–419 ZamarSKI, ul. Kamienna 14⁵ 43–440 Golezów, ul. Długa 37³ 43–385 Jasienica 164**Słowa kluczowe:** bocian czarny, *Ciconia nigra*, Śląsk Cieszyński.

Cenzusy przeprowadzone na początku XXI wieku na terenie powiatu cieszyńskiego pozwoliły ustalić obecność 11–14 rewirów lęgowych bociana czarnego *Ciconia nigra*. Na podstawie odnalezionych gniazd stwierdzono występowanie 7–9 par lęgowych oraz rewirów o nieudokumentowanym gniazdowaniu. Większość gniazd jest skupiona w północnej, nizinnej części powiatu, w której zlokalizowane są liczne kompleksy stawów rybnych, rzeki, potoki i rowy opaskowe z wodą, obfitujące w ryby – główny pokarm bociana czarnego. Opisano poszczególne stanowiska lęgowe, podano sposób zajęcia gniazd oraz policzono młode. Późnym latem i jesienią na spuszczanych stawach rybnych pojawiają się grupki bocianów czarnych, których liczebność może przekraczać nawet 20 osobników.