

**Bycznik *Typhaeus typhoeus* L. (Coleoptera, Geotrupidae)  
w pokarmie sowy uszatej *Asio otus* L. na Pomorzu Środkowym**

Minotaur Beetle *Typhaeus typhoeus* L. (Coleoptera, Geotrupidae)  
in food of Long-eared owl *Asio otus* L. in the middle part  
of Pomerania (N Poland)

TOMASZ HETMAŃSKI, OLEG ALEKSANDROWICZ, MAREK ZIÓŁKOWSKI

*Zakład Zoologii, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22B  
e-mail: t.hetmansk@onet.eu*

**Słowa kluczowe:** bycznik, *Typhaeus typhoeus*, sowa uszata, *Asio otus*, dieta, Pomorze Środkowe.

**Abstrakt:** Rozmieszczenie bycznika na Pomorzu jest słabo poznane. Ten chrząszcz o wysokiej zimowej aktywności jest typowym koprofagiem. Jego nowe stanowisko odkryto badając skład pokarmu sowy uszatej na Pomorzu Środkowym. Sowy zlokalizowano w młodniku sosnowym blisko wsi Brzezinec (gm. Słupsk, woj. pomorskie). W 261 wyplawkach zebranych zimą 2007/2008 i 40. wyplawkach z wiosny 2008 roku bycznik stanowił 7,8% zimowej i 1,8% wiosennej liczby ofiar sowy uszatej. W wyplawkach zawierających szczątki bycznika znacznie częściej występowały szczątki kostne nornika burego i nornicy rudej. Może to sugerować, że chrząszcz ten był łowiony przez sowy uszate w siedliskach ekotonalnych: na skraju lasu i pól uprawnych preferowanych przez te gryzonie.