

Strojniś nadobny *Philaeus chrysops* Poda, 1761 (*Araneae: Salticidae*) na nowych stanowiskach w Polsce

New localities of beautiful jumper *Philaeus chrysops* Poda, 1761 (*Araneae: Salticidae*) in Poland

MIŁOSZ OWIEŚNY¹, KRZYSZTOF SZPILA², ANDRZEJ OLEKSA³, ŁUKASZ OGONOWSKI⁴

¹ Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87–100 Toruń, ul. Gagarina 9
e-mail: milosz83@gmail.com

³ Instytut Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85–064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
e-mail: olek@ukw.edu.pl

² Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87–100 Toruń, ul. Gagarina 9
e-mail: szpila@biol.uni.torun.pl

⁴ 83–110 Czarlin, ul. Lipowa 52
e-mail: ogonowski.l@gmail.com

Słowa kluczowe: strojniś nadobny *Philaeus chrysops*, faunistyka, nowe stanowiska, Toruń, Poland.

Abstrakt: Strojniś nadobny *Philaeus chrysops* Poda, 1761 jest kserofilnym i litobiontycznym pajakiem zasiedlającym otwarte środowiska, głównie miejsca piaszczyste i naskalne. Pomimo iż gatunek ten jest rozprzestrzeniony w całej cieplejszej części Palearktyki, to jednak poza rejonem śródziemnomorskim jest rzadko notowany i uważany za zagrożony. Gatunek ten jest także wymieniany w *Czerwonej liście zagrożonych gatunków w Polsce*. W niniejszej pracy opisano nowe w Polsce stanowiska strojnisia nadobnego w Kotlinie Toruńskiej (UTM: CD36, CD37, CD46). Stanowiska te są prawdopodobnie jednymi z najbardziej na północ wysuniętych stwierdzeń gatunku w obrębie jego geograficznego zasięgu występowania.