

Interesujące gatunki storczykowatych w zlewni potoku Pleśnianka na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie)

Interesting orchid species in the Pleśnianka Stream basin, the Rożnów Foothills (the Western Carpathians)

KRYSTIAN BUDZIK, ALINA STACHURSKA-SWAKOŃ

Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

31–501 Kraków, ul. Kopernika 27

e-mail: krystian.budzik@uj.edu.pl, alina.stachurska-swakon@uj.edu.pl

Słowa kluczowe: *Cephalanthera damasonium*, *C. longifolia*, *Epipactis purpurata*, *Neottia nidus-avis*, *Platanthera bifolia*, *P. chlorantha*, storczyki, Pogórze Rożnowskie.

Rzadkie gatunki storczyków znaleziono w północnej części Pogórza Rożnowskiego (Pogórze Karpackie). W zlewni potoku Pleśnianka (dopływ rzeki Białej) stwierdzono występowanie: buławnika wielkokwiatowego *Cephalanthera damasonium*, buławnika mieczolistnego *C. longifolia*, kukułki szerokolistnej *Dactylorhiza majalis*, kruszczyka szerokolistnego *Epipactis helleborine*, kruszczyka purpurowego *E. purpurata*, podkolana białego *Platanthera bifolia*, podkolana zielonego *P. chlorantha* oraz gnieźnika leśnego *Neottia nidus-avis*. Rosły one w lasach liściastych: grądzie i buczynie. W latach 2007–2010 prowadzono obserwację populacji tych gatunków rosnących na sześciu stanowiskach. Zagrożeniem dla populacji storczyków na jednym ze stanowisk mogą być cięcia w drzewostanie powodujące lokalnie zmianę warunków świetlnych i termicznych, masowy pojaw siewek i podrostów drzew oraz zrywanie kwitnących pędów storczyków.