

Awifauna lęgowa Ziemi Nyskiej**Breeding avifauna of the Nysa Region**

GRZEGORZ KOPIJ

Department of Integrated Environmental Science
Ogongo Campus
University of Namibia
Private Bag 5520, Oshakati, NAMIBIA
e-mail: gkopij@unam.na

Słowa kluczowe: censusy, zbiorniki wodne, agrocenoza, fragmentacja lasu, trend populacyjny, Nysa, Otmuchów, *Ardea cinerea*, *Larus ridibundus*, *Apus apus*, *Corvus frugilegus*.

W pracy przedstawiono wyniki badań jakościowych i ilościowych awifauny lęgowej prowadzonych w latach 2002–2007 na Ziemi Nyskiej (ok. 720 km²) oraz analizę zmian w faunie ptaków tego regionu w ciągu ostatnich 122 lat. W latach 1888–2009 stwierdzono tu 155 gatunków lęgowych i 10 gatunków prawdopodobnie lęgowych (w tym 138 gatunków lęgowych i 6 prawdopodobnie lęgowych w latach 2002–2009). Gatunki osiągające na Ziemi Nyskiej stosunkowo wysokie zagęszczenia to: mewa białogłowa *Larus cachinnans*, mewa śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*, rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*, czapla siwa *Ardea cinerea*, rybitwa białoczelna *Sternula albifrons*, rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida* i brzegówka *Riparia riparia*. Cyraneczka *Anas crecca*, cietrzew *Tetrao tetrix*, krwawodziób *Tringa totanus*, samotnik *T. ochropus*, kraska *Coracias garrulus*, rudogłówka *Lanius senator* i orzechówka *Nucifraga caryocatactes* wycofały się z tego regionu jeszcze przed 1950 r. W ostatnich 40 latach wzrost liczebności wykazały populacje: perkoza dwuczubego *Podiceps cristatus*, zausznika *P. nigricollis*, czapli siwej, bociana białego *Ciconia ciconia*, łabędzia niemego *Cygnus olor*, błotniaka stawowego *Circus aeruginosus*, błotniaka łąkowego *C. pygargus*, jastrzębia *Accipiter gentilis*, puszczyk *Falco tinnunculus*, przepiórki *Coturnix coturnix*, mewy śmieszki, mewy białogłowej, rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, dzięcioła czarnego *Dryocopus martius*, pliszki górskiej *Motacilla cinerea*, pleszki *Phoenicurus phoenicurus*, kłaskawki *Saxicola rubicola*, muchołówki białoszyjej *Ficedula albicollis* i kruka *Corvus corax*. W tym samym okresie zmniejszyła się liczebność kuropatwy *Perdix perdix*, czajki *Vanellus vanellus*, pójdzki *Athene noctua*, gawrona *Corvus frugilegus*, brzegówki, sroki *Pica pica*, wrony *Corvus cornix*. Prawdopodobnie tendencje spadkowe dotyczą także populacji: łyski *Fulica atra*, kokoszki *Gallinula chloropus*, płomykówki *Tyto alba* i słowika rdzawego *Luscinia megarhynchos*.