

Pająki (Araneae) rezerwatu torfowiskowego „Bór na Czerwonym”**Spiders (Araneae) of the peat bog nature reserve “Bór na Czerwonym”**WŁODZIMIERZ CICHOCKI¹, ROBERT ROZWAŁKA²

¹ Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego
34–500 Zakopane, ul. Krupówki 10
e-mail: wcichocki@muzeumtatrzańskie.pl

² Zakład Zoologii UMCS
20–033 Lublin, ul. Akademicka 19
e-mail: arachnologia@wp.pl

Słowa kluczowe: *Araneae*, torfowiska, Kotlina Orawsko-Nowotarska.

W pracy przedstawiono wyniki badań araneofauny epigeicznej rezerwatu torfowiskowego „Bór na Czerwonym” niedaleko Nowego Targu. Zbadano skład gatunkowy zgrupowań pajaków w czterech reprezentatywnych zespołach roślinnych: *Pino rhaeticae-Sphagnetum*, *Eriophoro vaginati-Sphagnetum fallax*, *Vaccinio uliginosi-Pinetum* i *Calamagrostio villosae-Pinetum*. Łącznie złowiono 3011 osobników reprezentujących 94 gatunki. Najwięcej gatunków (55) odnotowano w *Pino rhaeticae-Sphagnetum*, najmniej (34 gatunki) w *Calamagrostio villosae-Pinetum*. Złowiono także nowy gatunek dla fauny Polski – *Sibianor larae* oraz szereg rzadkich w naszym kraju gatunków pajaków związanych z torfowiskami np.: *Carorita limnaea*, *Oryphantes angulatus*, *Taranucnus setosus*, *Arctosa lamperti*, *Alopecosa pinetorum*, *Scotina palliardi*, *Gnaphosa microps*, *G. muscorum*, *Neon valentulus*, *Talavera parvistyla*. Przeprowadzone badania pozwoliły na wzbogacenie listy pajaków znanych z terenu Kotliny Nowotarskiej o 74 gatunki.