

Drugie stwierdzenie kolonii lęgowej czapli siwej *Ardea cinerea* na Górnym Śląsku

The second record of the Grey Heron *Ardea cinerea* breeding colony in Upper Silesia

KRZYSZTOF BELIK¹, TOMASZ BIWO², DAMIAN CZECHOWSKI³, HENRYK KOŚCIELNY⁴

¹ Górnśląskie Koło Ornitologiczne
42–690 Boruszowice, ul. Składowa 5/1
e-mail: kris.bel@interia.pl

² Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
45–512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66
e-mail: tomasz.biwo.opole@rdos.gov.pl

³ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
40–032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22
e-mail: damian.czechowski.katowice@rdos.gov.pl

⁴ Górnśląskie Koło Ornitologiczne
42–609 Tarnowskie Góry, ul. Armii Krajowej 16/38
e-mail: hko7@interia.pl

Słowa kluczowe: czapla siwa, *Ardea cinerea*, czapliniec, Górny Śląsk.

Kolonie lęgowe czapli siwej *Ardea cinerea* znane są z obszaru całego kraju, jednak ich rozmieszczenie w południowej Polsce jest silnie rozproszone. W dniu 17 marca 2014 roku w drzewostanie sosnowym położonym w pobliżu kompleksu stawów rybnych w miejscowości Zborowskie w gminie Ciasna (powiat lubliniecki) odkryto niewielką kolonię lęgową czapli siwych. Policzone 25 zajętych gniazd zlokalizowanych na wysokich sosnach. Ponowna kontrola czaplińca po dwóch miesiącach (19 maja) wykazała obecność 36 par zajmujących gniazda. Wywiady przeprowadzone z pracownikami gospodarstwa rybackiego pozwoliły ustalić, że czapliniec ten istniał już w roku 2013. Nowo odkryta kolonia lęgowa jest drugą tego gatunku w województwie śląskim i pierwszą złożoną wyłącznie z gniazd czapli siwych. Najbliższe czynne dwa czaplińce od omówionej tu kolonii zlokalizowane są nad Kanałem Gliwickim koło Pyskowic (43 km w linii prostej) oraz koło miejscowości Stobrawa (72 km w linii prostej) w województwie opolskim.