

Ichtiofauna Dunajca od zapory zbiornika w Czchowie do ujścia do Wisły

Marek JELONEK, Mariusz KLICH i Roman ŻUREK

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

1. Wstęp

Ichtiofauną Dunajca i jego dopływów, poczynając od Nowickiego (1883, 1889), interesowało się wielu ichtiologów. Jednak większość prac z pierwszej połowy XX wieku (Dixon 1926, Żarnecki 1929, 1952, Chrzan 1947), dotyczyła wyłącznie opisu „kampanii łososiowych”, odzwierciedlając ówczesne przyrodnicze i gospodarcze znaczenie ryb dwuśrodowiskowych, a zwłaszcza troci wędrownej (*Salmo trutta* m. *trutta*). Dopiero późniejsze opracowania Solewski (1964, 1965), Klimczyk-Janikowska (1968), Skóra i Włodek (1969) zostały poświęcone biologii innych, niż dwuśrodowiskowe, gatunków ryb żyjących w zlewni Dunajca. Podobnie było z ogólnym opisem rybostanu zlewni Dunajca zapoczątkowanym przez Nowickiego (1883) i Niezabitowskiego (1903). Został on dopiero uzupełniony kilkadziesiąt lat później przez Bieniarza i Eplera (1972), Włodka i Skórę (1992) oraz (Starmacha 1983/1984). Jednak ogromna większość cytowanych powyżej prac dotyczyła górnej części Dunajca. Dolna część tej rzeki od zapory zbiornika Czchów do ujścia do Wisły, pomimo danych z połowów kontrolnych i z rejestrów połowów prowadzonych przez Polski Związek Wędkarski, Okręg w Tarnowie, była pod względem ichtiofaunistycznym słabo poznana. Niniejsza praca próbuje wypełnić tę lukę.

Celem przeprowadzonych badań było określenie składu gatunkowego i struktury ichtiofauny dolnej części Dunajca ze szczególnym uwzględnieniem gatunków prawie chronionych i zagrożonych.