

Nowe stanowiska przymiotna alpejskiego *Erigeron alpinus* subsp. *intermedius* i starca pomarańczowego *Senecio aurantiacus* w Tatrach

New occurrence sites of *Erigeron alpinus* subsp. *intermedius* and *Senecio aurantiacus* in the Tatra Mountains

JERZY KRUK

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
30–387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
e-mail: jerzy.kruk@uj.edu.pl

Słowa kluczowe: przymiotno alpejskie, *Erigeron alpinus*, starzec pomarańczowy, *Senecio aurantiacus*, Tatry.

Przymiotno alpejskie *Erigeron alpinus* L. subsp. *intermedius* (Schleich.) Pawł. jest jednym z najrzadszych gatunków we florze Polski znanym dotychczas tylko z dwóch stanowisk w Tatrach Zachodnich. Starzec pomarańczowy *Senecio aurantiacus* (Hoppe) Less. jest gatunkiem bardzo rzadkim w Polsce, znanym głównie z Tatr i Pienin. W 2009 roku odkryto w Tatrach Zachodnich nowe, bardzo liczne stanowisko starca pomarańczowego na wysokości 1730 m n.p.m., gdzie również znaleziono jeden okaz przymiotna alpejskiego. Nieco większą populację tego gatunku, liczącą 7 osobników, odkryto na północno-zachodnim stoku Ciemniaka, na wysokości 1900–1950 m n.p.m., co stanowi najwyższej położone stanowisko przymiotna w Tatrach polskich.