

## Malakofauna w holocenijskich osadach Kampinoskiego Parku Narodowego

### Malacofauna of Holocene deposits in the Kampinos National Park

STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ

*Polska Akademia Umiejętności*  
31–016 Kraków, ul. Sławkowska 16  
e-mail: [office@pau.krakow.pl](mailto:office@pau.krakow.pl)

**Słowa kluczowe:** subfossylna malakofauna, czwartorzęd, Kampinoski Park Narodowy, Polska.

Prezentowane rezultaty szczegółowej analizy zespołów subfossylnych mięczaków znalezionych na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego najbliższym otoczeniu. Umożliwiły one zestawienie i podsumowanie pełnego kompletu danych dotyczących występowania holocenijskiej malakofauny na omawianym terenie. Prezentowana fauna obejmuje 51 gatunków ślimaków i małży oraz wieczka zagrzebek i wapienne płytki ślimaków bezskorupowych, a ponadto kilka taksonów reprezentowanych przez ułamki skorup lub pojedyncze okazy, najczęściej niekompletnie zachowane. Przedstawione wyniki badań podsumowują pierwszy etap poznania czwartorzędowej fauny Parku jako wskaźnika zmian środowiska naturalnego w epoce holocenu, a zarazem wskazują na celowość kontynuowania tu analizy malakologicznej osadów najmłodszego okresu geologicznego.

