

Bogactwo gatunkowe porostów wsi Hermanówka

Species richness of lichens in the Hermanówka village

SYLWIA KIERCUL

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka
15–351 Białystok, ul. Wiejska 45E
e-mail: sylwiakiercul@op.pl

Słowa kluczowe: grzyby zlichenizowane, różnorodność gatunkowa, porosty chronione i zagrożone.

Prezentowano dokumentację lichenologiczną, obrazującą różnorodność gatunkową porostów w okolicach podlaskiej wsi Hermanówka, w gminie Juchnowiec Kościelny (woj. podlaskie). W 2014 roku na dwóch stanowiskach badawczych (jednym zbiorczym – wzdłuż wsi oraz jednym leśnym) określano zróżnicowanie gatunkowe porostów występujących na różnych typach podłoża. Wykazano występowanie 38 taksonów, w tym 37 w randze gatunków należących do epifitów (26 gatunków), epiksyli (12), epilitów (9) i epigeitów (3). Odnotowano również jeden takson zasiedlający dachówkę eternitową – misecznicę murową *Lecanora muralis*. O walorach lichenologicznych badanego terenu świadczy występowanie czterech gatunków objętych częściową ochroną gatunkową – chrobotka reniferowego *Cladonia rangiferina*, pustułki rurkowatej *Hypogymnia tubulosa*, *Tuckermannopsis chlorophylla* i brodaczkę kępkowej *Usnea hirta*, z których trzy ostatnie oraz mąkla tarniowa *Evernia prunastri* należą do taksonów zagrożonych w Polsce.