

Rozmieszczenie ryjówkowatych Soricidae w polskich Tatrach

Distribution of the Soricidae in the Polish Tatra Mts

AGNIESZKA WAŻNA¹, JAN CICHOCKI¹, ZBIGNIEW MIERCZAK², KRZYSZTOF PIKSA³,
TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA²

¹ Katedra Zoologii, Uniwersytet Zielonogórski
65–516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1
e-mail: j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl, a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

² Tatrzański Park Narodowy
34–500 Zakopane, ul. Kuźnice 1

³ Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
31–054 Kraków, ul. Podbrzezie 3

Słowa kluczowe: ryjówkowate, Soricidae, rozmieszczenie, Tatry.

W pracy przedstawiono aktualne dane dotyczące występowania ryjówkowatych w Tatrach polskich i u ich podnóży. W latach 1993–2012 odnotowano na 124 stanowiskach 301 osobników należących do pięciu gatunków ryjówkowatych: ryjówki aksamitnej *Sorex araneus*, ryjówki malutkiej *S. minutus*, ryjówki alpejskiej *S. alpinus*, rzęsorka rzeczka *Neomys fodiens* i rzęsorka mniejszego *N. anomalus*. Najpospolitszym gatunkiem była ryjówka aksamitna, którą wykazano na 64 stanowiskach (208 osobników). Znacznie rzadziej stwierdzana była ryjówka malutka (34 stanowiska i 61 osobników) i ryjówka górską (19 osobników w 16 miejscach). Rzęsorek rzeczek (11 osobników) obserwowany był na ośmiu stanowiskach zlokalizowanych w sąsiedztwie górskich potoków. Tylko dwukrotnie u podnóża Tatr, przy wlocie Doliny Strążyskiej (885 m n.p.m.) i na Polanie Zazadniej (910 m) został stwierdzony rzęsorek mniejszy.