

Nowe stanowiska zarazy gałęzistej *Orobanche ramosa* (Orobanchaceae) w województwie lubelskim

New sites of *Orobanche ramosa* (Orobanchaceae) in the Lublin province

PIOTR CHMIELEWSKI¹, ANNA CWENER²

¹ Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
22–400 Zamość, ul. Partyzantów 74/59
e-mail: pchmielewski4@wp.pl

² Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Geobotaniki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20–033 Lublin, ul. Akademicka 19
e-mail: acwener@wp.pl

Słowa kluczowe: *Orobanche ramosa*, Orobanchaceae, rozmieszczenie, żywiciiele, Płaskowyż Tarnogrodzki, Roztocze, województwo lubelskie, Polska.

Zaraza gałęzista *Orobanche ramosa* L. jest pasożytniczą rośliną niezwykle rzadko spotykaną w Polsce. Mimo iż gatunek ten podawano z 48 kwadratów siatki ATPOL o boku 10 km, to po roku 2000 nie udało się potwierdzić żadnego z tych stanowisk. W latach 2008–2010 odnaleziono dwa nowe miejsca występowania na Nizinie Nadwiślańskiej i Płaskowyżu Proszowickim. W wyniku poszukiwań terenowych prowadzonych przez autorów w 2012 roku odkryto nowe populacje zarazy gałęzistej w Woli Obszańskiej na Płaskowyżu Tarnogrodzkim oraz w okolicach Brzezin, Tarnowoli i Górecka Starego na Roztoczu Środkowym, w południowej części województwa lubelskiego. Rośliną żywicielską zarazy gałęzistej na Lubelszczyźnie jest tytoń. Potencjalne zagrożenie dla zarazy stanowi intensyfikacja stosowania środków ochrony roślin.