

Nowe populacje zarazy bladokwiatowej *Orobanche pallidiflora* (Orobanchaceae) w okolicach Tomaszowa Lubelskiego

New populations of *Orobanche pallidiflora* (Orobanchaceae) in the vicinity of Tomaszów Lubelski (E Poland)

PIOTR CHMIELEWSKI

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
22–400 Zamość, ul. Partyzantów 74/59
e-mail: pchmielewski4@wp.pl

Słowa kluczowe: *Orobanche pallidiflora*, Orobanchaceae, rozmieszczenie, siedlisko, Roztocze Środkowe, Równina Bełska, Polska.

Zaraza bladokwiatowa *Orobanche pallidiflora* Wimm. et Grab. to jeden z rzadziej spotykanych przedstawicieli rodziny zarazowatych Orobanchaceae we florze Polski. Dotychczas podano krajowe stanowiska tego gatunku z 37 kwadratów siatki ATPOL o boku 10 km, a na 18 z nich potwierdzono jego obecność (Piwowarczyk i in. 2010). W 2011 roku, w ramach obserwacji terenowych prowadzonych przez autora na krawędzi doliny Sołokiji, odnaleziono cztery nowe populacje tej rośliny zlokalizowane w sąsiedztwie wsi Przeorsk i Nowy Przeorsk blisko Tomaszowa Lubelskiego. Najobfitsza z nich liczy ponad 1000 pędów. Występowaniu zarazy bladokwiatowej w województwie lubelskim zagrażają procesy intensyfikacji rolnictwa – przede wszystkim zaorywanie ugorów będących jej głównym siedliskiem.