

Ponikło jajowate *Eleocharis ovata* na Nizinie Południowopodlaskiej

Eleocharis ovata in the Nizina Południowopodlaska Lowland (E Poland)

MICHAŁ FALKOWSKI¹, KRYSTYNA NOWICKA-FALKOWSKA²

Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Akademia Podlaska

08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12

e-mail: ¹mfzuraw@wp.pl, ²falko4@wp.pl

Słowa kluczowe: ponikło jajowate *Eleocharis ovata*, rozmieszczenie, Nizina Południowopodlaska, stawy rybne.

Abstrakt: Praca przedstawia informację o rozmieszczeniu *Eleocharis ovata* na terenie Niziny Południowopodlaskiej. Dotychczas znane były tu trzy stanowiska tego gatunku: Klimonty (FD 2710), Opole Stare (FD 2421) i rezerwat przyrody Stawy Broszkowskie (FD 2421). W trakcie badań nad szatą roślinną tego regionu stwierdzono dwa nowe stanowiska *Eleocharis ovata*: na stawach w Mościbrodach (FD 3511) i Rybakówce (FD 2511). Te małe zbiorniki wodne są najważniejszym dla tego gatunku miejscem występowania na Nizinie Południowopodlaskiej. Ich trwałość stwarza szansę na przetrwanie gatunku w makroregionie. Jednak, podobnie jak w przypadku innych gatunków zagrożonych i chronionych rosnących w obrębie stawów rybnych, warunkiem jego zachowania jest ekstensywna gospodarka rybacka. W fitocenozach z ponikłem jajowatym stwierdzono m.in. gatunki wymienione na regionalnej czerwonej liście. Należą do nich: cibora brunatna *Cyperus fuscus*, sitniczka szczecinowata *Isolepis setacea*, sit główkowaty *Juncus capitatus* i namulnik brzegowy *Limosella aquatica*.