

Ryjkowcowate (Coleoptera: Curculionoidea) Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the Suwałki Landscape Park

DAWID MARCZAK¹, ROBERT LASECKI²

¹ Wydział Ekologii

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14

e-mail: dawid.marczak@gmail.com

² 05-230 Kobyłka, ul. Czarnoleska 20a/1

e-mail: petrel@o2.pl

Słowa kluczowe: Coleoptera, Curculionoidea, Suwalski Park Krajobrazowy, rozmieszczenie, dane faunistyczne.

Suwalski Park Krajobrazowy jest najstarszym polskim parkiem krajobrazowym. Został utworzony w 1976 roku. Mimo małej powierzchni (6284 ha), Park obfituje w bogactwo siedlisk, wśród których szczególnie cenne dla zachowania entomofauny są stoki i pagórki porośnięte roślinnością termofilną i kserofilną. W ciągu 36-letniej historii Park nie doczekał się pełnego rozpoznania fauny. W latach 2006–2008 prowadzono badania chrząszczy SPK, a niniejsza praca przedstawia ich fragment dotyczący przedstawicieli nadrodziny ryjkowcowatych Curculionoidea. Wykazano obecność 141 gatunków należących do 6 rodzin: ryjkowców Curculionidae, Nemonychidae, pędrusi Apionidae, kobielatek Anthribidae, Attelabidae i tutkarzy Rhynchitidae. Dwa gatunki: *Lixus tibialis* Boheman, 1843 i *Pseudorchestes pratensis* (Germar, 1821) nie były wcześniej notowane z Pojezierza Mazurskiego. Odnaleziono kilka rzadkich w kraju taksonów, w tym dwa gatunki kserotermofilne: *Protapion ruficrus* (Germar, 1817) i *Lixus tibialis*.