

**Kukułka krwista *Dactylorhiza incarnata* (Orchidaceae)  
– nowy gatunek dla flory Pogórza Strzyżowskiego**

*Dactylorhiza incarnata* (Orchidaceae) – a new species in the flora  
of the Strzyżowskie Foothills

TOMASZ WÓJCIK

*Zakład Ekologii Roślin  
Instytut Botaniki UJ  
31–512 Kraków, ul. Lubicz 46  
e-mail: antomi7@wp.pl*

**Słowa kluczowe:** kukułka krwista typowa, *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata*, Pogórze Strzyżowskie, storczykowate, gatunki zagrożone.

Opisano nowe stanowisko kukułki krwistej *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó w południowo-wschodniej Polsce, na obszarze Pogórza Strzyżowskiego, skąd gatunek ten nie był wcześniej podawany. Występuje tu podgatunek typowy subsp. *incarnata*. Nowo odkryte stanowisko jest położone w Wielopolu Skrzyńskim, w przysiółku Nowa Wieś. Populacja storczyka, licząca 164 osobniki kwitnące, rośnie w niewielkiej dolince, w nieużytkowanych lub sporadycznie koszonych łąkach ze związku *Calthion*, w zaroślach z dominacją olszy czarnej *Alnus glutinosa* oraz na przylegającym bezpośrednio do doliny zboczu o ekspozycji południowej, gdzie na odłogu wykształcają się zbiorowiska łąkowe z udziałem gatunków ciepłolubnych.