

Wyniki monitoringu czajki *Vanellus vanellus* i kszyka *Gallinago gallinago* w Kampinoskim Parku Narodowym

Preliminary results of monitoring of northern lapwing *Vanellus vanellus* and common snipe *Gallinago gallinago* in Kampinos National Park

DANUTA PEPEŁOWSKA-MARCZAK

Kampinoski Park Narodowy
05–080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
e-mail: d.marczak@kampinoski-pn.gov.pl

Słowa kluczowe: czajka, *Vanellus vanellus*, kszyk, *Gallinago gallinago*, monitoring ptaków, Kampinoski Park Narodowy.

W latach 2008–2012 monitorowano stan populacji czajki *Vanellus vanellus* i kszyka *Gallinago gallinago* w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyniki monitoringu wskazują, że wprowadzenie koszeń podmokłych łąk w Parku sprzyja zwiększaniu się liczebności czajki na tym obszarze, a mozaika terenów koszonych i zarastających stwarza dogodne siedliska dla kszyka. Liczebność czajki na badanych powierzchniach w latach 2008–2011 wzrastała, a w roku 2012 drastycznie się zmniejszyła (o ponad 88%), co mogło być spowodowane jednorazowym wstrzymaniem koszeń, w efekcie ulewnych deszczy i zbyt wysokim poziomem wód gruntowych w okresie lęgowym. Czynniki te nie miały wpływu na liczebność kszyka, która w trakcie monitoringu wzrastała.