

Porost pępówka pofałdowana *Omphalina umbellifera* (L.: Fr.) Quél. – nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim

A new locality of *Omphalina umbellifera* (L.: Fr.) Quél. in Gdańsk Pomerania

MARCIN STANISŁAW WILGA

*Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych, Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
e-mail: mwilga@mech.pg.gda.pl*

Słowa kluczowe: grzyby podstawkowe, porosty, północna Polska.

Abstrakt: Pępówka pofałdowana *Omphalina umbellifera* (L.: Fr.) Quél. [syn. *O. ericetorum* (Pers.) M. Lange] jest porostem należącym do grzybów podstawkowych (*Basidiomycota*) (Wojewoda 2003). Takson ten wymieniany jest w literaturze również pod nowo przyjętą nazwą – lichenomfalia baldaszkowa *Lichenomphalia umbellifera* (L.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (por. Olech 2004). Lichenizowane *Basidiomycota* są rzadkością, bowiem u około 90% porostów komponent grzybowy (mikobiont) stanowią grzyby workowe (*Ascomycota*) (Wójciak 2003). Pępówka pofałdowana należy do rzędu pieczarkowców *Agaricales* i rodziny gąskowatych *Tricholomataceae* (Wojewoda 2003). Gatunek umieszczono na polskiej czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w kategorii „rzadkie” – R (Wojewoda, Ławrynówicz 2006) oraz na czerwonej liście porostów w kategorii „bliskie zagrożenia” – NT (Cieśliński i in. 2006).