

Kosaciec syberyjski *Iris sibirica* – nowe stanowisko w okolicach Łańcuta**The Siberian iris *Iris sibirica* – a new station near Łańcut (SE Poland)**

MAŁGORZATA JAŻWA

*Zakład Taksonomii Roślin, Fitogeografii i Herbarium
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
31–501 Kraków, ul. Kopernika 27
e-mail: malgorzata_jazwa@interia.pl*

Słowa kluczowe: Podgórze Rzeszowskie, *Iris sibirica*, łąki wilgotne, *Molinion*, Łańcut.

Kosaciec syberyjski *Iris sibirica* L. jest gatunkiem charakterystycznym dla łąk ze związku *Molinion caeruleae*, w Polsce narażonym na wyginięcie ze względu na zmiany sposobu użytkowania łąk. Nowe stanowisko odnotowano na przełomie maja i czerwca 2008 roku, w pobliżu Łańcuta, na terenie Podgórze Rzeszowskiego. Stosunkowo małej populacji towarzyszą takie gatunki, jak: krwiściąg lekarski *Sanguisorba officinalis*, firletka poszarpana *Lychnis flos-cuculi*, przytulia północna *Galium boreale*, krwawnica pospolita *Lythrum salicaria*. Skład florystyczny oraz usytuowanie w zwartym kompleksie łąkowym przemawiają za naturalnym pochodzeniem stanowiska.

SUMMARY

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3): 265–266, 2011

Jaźwa M. The Siberian iris *Iris sibirica* – a new station near Łańcut (SE Poland)

The Siberian iris *Iris sibirica* L. is a species characteristic of the *Molinion* alliance wet meadow. In Poland it is considered a vulnerable species. The cause of this lies in the change of the meadow management. A new station was found at the turn of May and June 2008 near Łańcut at the Podgórze Rzeszowskie piedmont. The population is relatively small (3 large – with 60 specimens – and 5 small clumps). The iris grows in the vicinity of such species as: *Sanguisorba officinalis*, *Lychnis flos-cuculi*, *Galium boreale*, *Lythrum salicaria*. The floristic composition and the location within a dense meadow complex indicate that the station is of a natural origin.