

Ssaki pilchowate *Gliridae* południowej części Ziemi Kłodzkiej

Dormice *Gliridae* in the southern part of the Ziemia Kłodzka

AGNIESZKA WAŻNA¹, JAN CICHOCKI¹, DOROTA JAKUBIEC², DARIUSZ ŁUPICKI³,
MONIKA NADOLSKA-KARPIŃSKA⁴

¹ Katedra Zoologii, Uniwersytet Zielonogórski
65–246 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1
e-mail: j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl, a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

² Katedra Podstaw Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego
51–629 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35

³ Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
51–631 Wrocław, ul. Kozuchowska 5b
e-mail: dariusz.lupicki@up.wroc.pl

⁴ 54–152 Wrocław, ul. Wiślana 10/11

Słowa kluczowe: popielica, *Glis glis*, orzesznica, *Muscardinus avellanarius*, analiza wyplułek sów, występowanie, Ziemia Kłodzka.

Abstrakt: Pilchowate *Gliridae* należą do grupy chronionych ssaków zasiedlających Ziemię Kłodzką. W poprzednim wieku stwierdzono tu występowanie trzech gatunków: popielicy *Glis glis*, koszatki *Dryomys nitedula* i orzesznicy *Muscardinus avellanarius*. Ziemia Kłodzka jest niejednorodna pod względem fizjograficznym i z części obszaru brakuje aktualnych informacji o występowaniu pilchowatych. Na podstawie analiz wyplułek sów: puszczyka *Strix aluco*, płomykówki *Tyto alba* i puchacza *Bubo bubo* oraz obserwacji terenowych prowadzonych w latach 2001 i 2002 w Masywie Śnieżnika i Gór Bystrzyckich stwierdzono 11 nowych stanowisk popielicy i dwa orzesznicy.