

Pijawka lekarska *Hirudo medicinalis* (Annelida: Hirudinea) w zachodniej Polsce

The medicinal leech *Hirudo medicinalis* (Annelida: Hirudinea) in Western Poland

JAN CICHOCKI¹, PIOTR DĄBKOWSKI⁵, DARIUSZ ŁUPICKI², MAREK MACIANTOWICZ⁴, JOANNA MĄKOL³, AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA⁵, ANDRZEJ ZAWAL⁵

¹ Katedra Zoologii, Uniwersytet Zielonogórski
65–516 Zielona Góra, ul. Szafrana 1
e-mail: j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl

² Muzeum Przyrodnicze
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
51–630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 38D
e-mail: dariusz.lupicki@up.wroc.pl

³ Instytut Biologii,
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
51–631 Wrocław, ul. Kozuchowska 5B
e-mail: joanna.makol@up.wroc.pl

⁴ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
65–550 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a
e-mail: marek.maciantowicz@zielonagora.lasy.gov.pl

⁵ Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
Uniwersytet Szczeciński
71–415 Szczecin, ul. Wąska 13
e-mail: piotrdab@univ.szczecin.pl;
zawal@univ.szczecin.pl

Słowa kluczowe: *Hirudo medicinalis*, zachodnia Polska, rozmieszczenie, status ochronny.

W trakcie obserwacji terenowych prowadzonych w latach 2000–2009 stwierdzono 12 nowych stanowisk pijawki lekarskiej *Hirudo medicinalis* Linnaeus, 1758, zlokalizowanych w zachodniej Polsce. Bezkręgowce te zasiedlały niemal wyłącznie niewielkie (do 1 ha), średnie zbiorniki wodne. Gatunek ten preferuje płytkie, szybko nagrzewające się akweny o mulistym dnie i obfitej roślinności przybrzeżnej. Większość wykrytych stanowisk była izolowana, czyli rozmieszczona w znacznej odległości od siebie. Głównym zagrożeniem dla tego taksonu wydaje się zanik siedlisk, a zwłaszcza torfianek, glinianek i starorzeczy.