

Ptaki szponiaste Accipitriformes oraz bocian czarny *Ciconia nigra* w Bieszczadzkim Parku Narodowym w okresie lęgowym 2009–2014

Birds of prey Accipitriformes and black stork *Ciconia nigra* in Bieszczady National Park in the breeding season in 2009–2014

MARIAN STÓJ¹, KONRAD STÓJ²

Komitet Ochrony Orłów Region Podkarpacki

¹ 38–200 Jasło, ul. Podzamcze 1a

² 38–200 Jasło, ul. Krasińskiego 53/28

e-mail: mstoj@poczta.fm, konsto@poczta.fm

Słowa kluczowe: lęgowe ptaki szponiaste, bocian czarny, Bieszczadzki PN.

W okresie lęgowym 2009–2014 prowadzono badania ptaków szponiastych Accipitriformes oraz bociana czarnego *Ciconia nigra* na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odnotowano występowanie 6 gatunków szponiastych (trzmiełojad *Pernis apivorus*, jastrząb *Accipiter gentilis*, krogulec *A. nisus*, myszołów *Buteo buteo*, orlik krzykliwy *Clanga pomarina*, orzeł przedni *Aquila chrysaetos*) oraz bociana czarnego. Najliczniejszym gatunkiem był myszołów (35 rewirów lęgowych). Gniazdowania orła przedniego na terenie Parku nie stwierdzono. Niepewne też było gniazdowanie jastrzębia. Zarejestrowano 4 rewiry z gniazdami orlika krzykliwego, którego sukces lęgowy w latach 2009–2014 wyniósł 66,7%. Wykryto 3–4 rewiry bociana czarnego oraz znaleziono jedno gniazdo z lęgiem. Bieszczadzki Park Narodowy charakteryzuje się stosunkowo niewielką liczbą lęgowych gatunków ptaków szponiastych i oprócz myszołowa (12 par/100 km²) ich zagęszczenia były niskie.