

Murawa kserotermiczna z zawilcem wielkokwiatowym *Anemone sylvestris* L. na Pogórzu Przemyskim

The xerothermic grassland with the snowdrop windflower *Anemone sylvestris* L. on the Przemyskie Foothills (SE Poland)

STANISŁAW KUCHARZYK

Bieszczadzki Park Narodowy
38–700 Ustrzyki Dolne, ul. Betska 7
e-mail: skucharzyk@bdpn.pl

Słowa kluczowe: murawy kserotermiczne, zawilec wielkokwiatowy, Pogórze Przemyskie, dolina Wiaru, ochrona czynna, wypalanie traw.

Abstrakt: W pracy opisano cenną murawę kserotermiczną ze związku *Cirsio-Brachypodium pinnati* odnaniezoną w Makowej (środkowa część doliny Wiaru). W zbiorowisku tym stwierdzono liczne występowanie zawilca wielkokwiatowego *Anemone sylvestris* oraz dwóch innych gatunków wymienionych w *Czerwonej Księdze Karpat Polskich*: pępowy różyczkolistnej *Crepis praemorsa* i prosienicznika plamistego *Hypochoeris maculata*. Odnotowano tu także 13 innych gatunków objętych ochroną prawną (m.in.: storczykę kulistą *Traunsteinera globosa*, storczyka męskiego *Orchis mascula*, gólkę długoostrogową *Gymnadenia conopsea*, lilię złotogłów *Lilium martagon*) oraz liczne interesujące gatunki kserotermiczne (bodziszek czerwony *Geranium sanguineum*, oman szorstki *Inula hirta*, tymotkę Boehmera *Phleum phleoides*, główienkę wielkokwiatową *Prunella grandiflora*, koniczynę długokłosową *Trifolium rubens*, przetacznika ząbkowanego *Veronica austriaca*). Przeanalizowano trudności związane ze skuteczną ochroną zbiorowisk kserotermofilnych w związku z zaniechaniem użytkowania. Wskazano także znaczenie wiosennego wypalania traw dla zachowania tych zbiorowisk.