

Nowe stwierdzenia rozrodu borowiaczka *Nyctalus leisleri* na Pomorzu

New records of Lesser Noctule *Nyctalus leisleri* breeding in the Pomerania region (N Poland)

MATEUSZ CIECHANOWSKI¹, GRAŻYNA SADOWSKA^{1,2}, MARTA WIĘCKOWSKA¹, ANETA ZAPART¹

¹ Akademyckie Koło Chiropterologiczne
Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” w Gdańsku
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański
80–308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59
e-mail: matciech@kki.net.pl

² Wdzydzki Park Krajobrazowy
83–400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5E

Słowa kluczowe: nietoperze, Chiroptera, rozmieszczenie, Polska, Pomorze, pojezierza.

Borowiaczek *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1818) jest gatunkiem nietoperza w kontynentalnej Europie ściśle związanym ze starymi drzewostanami, w *Polskiej czerwonej księdze zwierząt* ma status gatunku narażonego na wyginięcie (kategoria VU). W południowo-wschodniej części kraju występuje stosunkowo często i licznie, a w niektórych kompleksach leśnych (takich jak Puszcza Białowieska i Kozienicka) należy do dominujących składników chiropterofauny. W zachodniej części kraju jest już znacznie rzadszy, a na Pomorzu Gdańskim należy do najrzadszych gatunków nietoperzy odbywających rozród. Karmiące samice złowiono tu jedynie w Puszczy Darżlubskiej i na Pojezierzu Iławskim. W latach 2010–2011 autorzy stwierdzili po raz pierwszy rozród borowiaczka nad Zagórką Strugą (Trójmiejski Park Krajobrazowy) i nad rzeką Kwaczą koło Słupska.