

Porosty epifityczne parku przypałacowego w Opinogórze Górnej (Północne Mazowsze)

Epiphytic lichens of the manor park in Opinogóra Górna (N Mazovia)

DARIUSZ KUBIAK*, ANNA BIEDUNKIEWICZ, DAMIAN KOŹNIEWSKI

Katedra Mykologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10–719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A
*e-mail: darkub@uwm.edu.pl

Słowa kluczowe: porosty, epifity, różnorodność, zagrożenie, gatunki leśne.

Przedstawiono zróżnicowanie taksonomiczne i ekologiczne porostów epifitycznych parku przypałacowego w Opinogórze Górnej. W wyniku przeprowadzonych badań odnotowano 59 gatunków, wśród których 7 objętych jest w Polsce ochroną, a 17 ma status zagrożonych wymarciem. Największe zróżnicowanie taksonów stwierdzono na korze klonów, jesionów, jabłoni, dębów i grabów. Biota porostów parku charakteryzuje się znacznym udziałem gatunków notowanych zazwyczaj na obszarach leśnych, z których najbardziej interesującymi są: rzędnica pospolita *Acrocordia gemmata*, kropnica żółtawa *Bacidia rubella*, trzonecznica zielonawa *Chaenotheca phaeocephala*, ochrost pyszny *Ochrolechia bahusiensis* i pismaczek zmienny *Opegrapha varia*. Na terenie parku stwierdzono ponadto kilka dość rzadkich i wymierających w skali kraju gatunków, charakterystycznych dla drzew przydrożnych: obrostnicę rzęsowatą *Anaptychia ciliaris*, soreńca dachówkowatego *Physconia perisidiosa*, wabnicę kielichowatą *Pleurosticta acetabulum* i odnożyce jesionową *Ramalina fraxinea*. Uzyskane wyniki stanowią przyczynek do poznania rozmieszczenia porostów na obszarze północnego Mazowsza oraz źródło danych o warunkach bioekologicznych gminy Opinogóra Górna.