

Sukcesja na podmokłych terenach otwartych

Ecological succession on open waterlogged areas

ANNA ZAGÓROWICZ

*Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
01–692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
e-mail: anna.barszcz@ios.edu.pl*

Słowa kluczowe: sukcesja, obszary wodno-błotne, zarastanie, Bagna Biebrzańskie.

W 2011 roku na przylegającym do rzeki Biebrzy terenie obszaru Natura 2000 wykonano zdjęcia fitosocjologiczne oraz spis flory. Badania wykonano na terenach podmokłych, na których prowadzone jest regularne koszenie oraz na terenach, gdzie następuje spontaniczna sukcesja – wkraczanie na otwartą przestrzeń drzew i krzewów. Następnie porównano dane pochodzące z tych dwóch typów obszarów w celu zidentyfikowania roślin zielnych, które jako pierwsze wkraczają na niekoszone tereny wraz z gatunkami drzewiastymi. Przeprowadzone porównania wykazały większą różnorodność biologiczną terenów zarastających (ze względu na przejściowy charakter tych ekosystemów) oraz większe pokrywanie gatunków klasy *Molinio-Arrhenatheretea*, podczas gdy większą ilościowością na terenach koszonych odznaczały się gatunki charakterystyczne z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*.