

Drobne ssaki Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w pokarmie puszczyka *Strix aluco*

Small mammals of Chojnowski Landscape Park in the diet of the tawny owl *Strix aluco*

JERZY ROMANOWSKI¹, ADAM TARŁOWSKI², GRZEGORZ LESIŃSKI³, ADAM OLSZEWSKI⁴

¹ Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
01–938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
e-mail: romanowski@cbe-pan.pl

² Ussuri – Ochrona Przyrody
05–840 Brwinów, ul. Myśliwska 14
e-mail: adam.tarlowski@gmail.com

³ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
02–787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
e-mail: glesinski@wp.pl

⁴ Kampinoski Park Narodowy
05–080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
e-mail: ad.ol@wp.pl

Słowa kluczowe: gryzonie, ryjówkokszałtne, nietoperze, wypluwki, dieta, drapieżnictwo.

Zbadano skład zgrupowania drobnych ssaków Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na podstawie analizy pokarmu puszczyka *Strix aluco*. W latach 2010–2012 zbierano wypluwki na 16 stanowiskach rozproszonych w północno-wschodniej części Parku. Stwierdzono łącznie 1038 osobniki należące do 15 gatunków drobnych ssaków, w tym głównie gryzoni i ryjówkokszałtnych, a także nietoperzy. Do najliczniej łowionych przez puszczyka gatunków należały: nornica ruda *Myodes glareolus* (351 osobników), ryjówka aksamitna *Sorex araneus* (173), mysz leśna *Apodemus flavicollis* (127) i badylarka *Micromys minutus* (64). Warte odnotowania jest także stwierdzenie gatunków rzadziej rejestrowanych w diecie puszczyka: rzęsorka rzeczka *Neomys fodiens* oraz nietoperzy – nocka Natterera *Myotis nattereri*, borowca wielkiego *Nyctalus noctula* i gacka brunatnego *Plecotus auritus*. Poza drobnymi ssakami wśród ofiar puszczyka zanotowano ptaki (73 osobniki), gady (3), płazy (138), ryby (6) i owady (28).