

Nowo odkryte stanowiska salwinii pływającej *Salvinia natans* w starorzeczach Bugu**The newly discovered sites of *Salvinia natans* in oxbow lakes of the Bug River**

PAWEŁ MARCINIUK, JOLANTA MARCINIUK, KAMIL KRYŃSKI

Zakład Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08–110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
e-mail: pawelm@uph.edu.pl, jolam@uph.edu.pl, oriolus1@tlen.pl

Słowa kluczowe: *Salvinia natans*, paproć wodna, roślina ekspansywna, rzeka Bug.

W sierpniu 2011 roku stwierdzono liczne występowanie *Salvinia natans* (L.) All. w korycie Bugu i w dużych starorzeczach mających połączenie z rzeką. Gatunek ten obserwowano we wszystkich kontrolowanych punktach pomiędzy starorzeczem w miejscowości Bużyska a korytem rzeki w Terespolu, poniżej ujścia rzeki Muchawiec (prawobrzeżny, białoruski dopływ Bugu). Kolejnymi miejscami występowania salwinii były: starorzecze w Bużyskach, starorzecze i koryto rzeki w miejscowości Drażniew, jezioro Trojan koło Zabuża, koryto Bugu w Serpelicach, koryto rzeki i starorzecze koło Gnojna, koryto rzeki oraz miejsce połączenia Bugu ze starorzeczem w Pratulinie i koryto rzeki w Terespolu poniżej ujścia Muchawca. Nie stwierdzono salwinii w Bugu powyżej ujścia Muchawca, w miejscowości Michałowo. Obecność salwinii w każdym kontrolowanym punkcie poniżej ujścia Muchawca oraz jej brak powyżej ujścia tej rzeki wskazuje, że omawiana roślina przybyła z Białorusi podczas wezbrań Muchawca.