

## Rozmieszczenie populacji nornika zwyczajnego *Microtus arvalis* w Tatrach

### Distribution of the common vole *Microtus arvalis* population in the Tatra Mts

JAN CICHOCKI<sup>1</sup>, AGNIESZKA WAŻNA<sup>1</sup>, ZBIGNIEW MIERCZAK<sup>2</sup>, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Katedra Zoologii, Uniwersytet Zielonogórski  
65–516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1  
e-mail: j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl, a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

<sup>2</sup> Tatrzański Park Narodowy  
34–500 Zakopane, ul. Kuźnice 1

**Słowa kluczowe:** nornik zwyczajny, *Microtus arvalis*, Tatry, rozmieszczenie populacji, wypas owiec.

Nornik zwyczajny *Microtus arvalis* (Pallas, 1778) jest jednym z najliczniejszych kręgowców lądowych Polski, szeroko rozprzestrzenionym zwłaszcza w nizinnej części kraju. Występuje głównie na terenach wykorzystywanych rolniczo: łąkach, pastwiskach, uprawach. Dotychczas nornik zwyczajny nie został stwierdzony w polskiej części Tatr. Odłowy prowadzone w latach 2004–2012 wykazały obecność tego gatunku na dziesięciu powierzchniach próbnych w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz na niżej położonych terenach przyległych. Wszystkie stanowiska zlokalizowane były w reglu dolnym na śródleśnych polanach, na których prowadzony był wypas bądź wykaszanie. Gryzonie odłowiono w Tatrach na wysokościach od 910 do 1090 m n.p.m. W słowackiej części Tatr Wysokich norniki zwyczajne rejestrowano do wysokości 1320 m n.p.m.