

## Występowanie i rozmieszczenie orzesznicy *Muscardinus avellanarius* w polskiej części Tatr i na Podtatrzu

The occurrence and distribution of the common dormouse  
*Muscardinus avellanarius* in the Tatra Mountains  
and the Sub-Tatra region

AGNIESZKA WAŻNA<sup>1</sup>, JAN CICHOCKI<sup>1</sup>, ZBIGNIEW MIERCZAK<sup>2</sup>, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA<sup>2</sup>,  
MICHAŁ OWCA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Katedra Zoologii, Uniwersytet Zielonogórski  
65–516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1  
e-mail: j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl, a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

<sup>2</sup> Tatrzański Park Narodowy  
34–500 Zakopane, ul. Kuźnice 1

**Słowa kluczowe:** orzesznica, *Muscardinus avellanarius*, rozmieszczenie, Tatry, Podtatrze.

Orzesznica *Muscardinus avellanarius* jest najczęściej stwierdzanym przedstawicielem ssaków pilchovatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym. W latach 2004–2011 odnotowano ten gatunek w 19 różnych miejscach Tatr. Orzesznicę stwierdzono również w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (2 stanowiska) i na Spiszu (1 stanowisko). Najczęściej zwierzęta te rejestrowano na skrajach lasu oraz na śródleśnych polanach porośniętych maliniskami. Nieco ponad połowę stanowisk zlokalizowano w lasach regla dolnego. Gatunek odnotowany został również w reglu górnym oraz powyżej górnej granicy lasu – w piętrze kosodrzewiny *Pinus mugo*. Najwyżej zlokalizowane stanowisko tego gryzonia znajdowało się na wysokości 1750 m n.p.m.