

Awifauna doliny Górnej Pilicy na odcinku Pukarzów–Koniecpol w latach 2000–2010**Avifauna of the Upper Pilica river valley between Pukarzów and Koniecpol in 2000–2010**GRZEGORZ KACZOROWSKI¹, STANISŁAW CZYŻ²¹ 97–532 Żytno, Pukarzów 40a
e-mail: avespuk@wp.pl² 32–310 Jaroszewiec, ul. Leśna 38/31
e-mail: cygcyg@wp.pl**Słowa kluczowe:** dynamika przelotu, stawy rybne, Górna Pilica, dolina rzeki, Okołowice.

W latach 2000–2010 w dolinie Górnej Pilicy pomiędzy Koniecpolem a Pukarzowem stwierdzono 222 gatunki ptaków, w tym 118 uznano za lęgowe i prawdopodobnie lęgowe. Spośród obserwowanych gatunków 54 jest wymienionych w Załączniku I tzw. Dyrektywy Ptasiej, a trzy gatunki lęgowe – derkacz *Crex crex*, rycyk *Limosa limosa* i kulik wielki *Numenius arquata* – są wskazane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako gatunki zagrożone globalnie. Ze względu na cenne walory przyrodnicze badany obszar znajduje się w sieci Natura 2000. Najcenniejszymi siedliskami dla gatunków lęgowych są stawy hodowlane w Koniecpolu-Chrzastowie oraz kompleksy łąk w okolicach Pukarzowa i Okołowic. Bardzo ważnym miejscem odpoczynku i żerowania dla ptaków w okresach migracji są stawy w Okołowicach, na których w latach prowadzenia obserwacji stwierdzono 30 gatunków siewkowców Charadrii. Jest to zatem jedno z ważniejszych miejsc dla tej grupy ptaków na obszarze województwa śląskiego. W porównaniu ze starszymi danymi na omawianym obszarze przestały gniazdować takie gatunki ptaków, jak: zauszniak *Podiceps nigricollis*, sieweczka obrożna *Charadrius hiaticula*, śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*, rybitwa czarna *Chlidonias niger* i podróżniczek *Luscinia svecica*, natomiast jako nowe pojawiły się: gęgawa *Anser anser* i kulik wielki. Warunkiem utrzymania lub polepszenia jakości siedlisk jest zachowanie ekstensywnej gospodarki i wdrażanie programów rolnośrodowiskowych.