

Gnojanka różowawa *Bolbitius coprophilus* (Peck) Hongo – nowy gatunek grzyba w Polsce

Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo – a new fungus new to Poland

ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI¹, ANNA KUJAWA², BŁAŻEJ GIERCZYK³

¹Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02–776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
e-mail: andrzej_szczepkowski@sggw.pl

²Stacja Badawcza Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi
64–000 Kościan, Turew, ul. Szkolna 4
e-mail: ankujawa@man.poznan.pl

³Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
60–780 Poznań, ul. Grunwaldzka 6
e-mail: hanuman@amu.edu.pl

Słowa kluczowe: *Bolbitius coprophilus*, gnojanka różowawa, grzyby koprofilne, występowanie, Polska.

Abstrakt: W pracy przedstawiono nowy dla Polski gatunek grzyba – *Bolbitius coprophilus* (Peck) Hongo. Stanowisko zlokalizowane jest na wybiegu stajni znajdującej się w Parku Skaryszewskim im. I.J. Paderewskiego w Warszawie. Owocniki obserwowano latem 2007 i 2008 roku na odchodach końskich. Podano wymagania ekologiczne gatunku oraz cechy makro- i mikroskopowe owocników. Zaproponowano polską nazwę dla tego taksonu.