

Żerowanie niedźwiedzia brunatnego *Ursus arctos* na jodłach w polskiej części Karpat

The feeding of the brown bear *Ursus arctos* on fir in the Polish Carpathian Mountains

EWA ZYŚK-GORCZYŃSKA¹, ZBIGNIEW JAKUBIEC²

*Institut Ochrony Przyrody PAN
Dolnośląska Stacja Terenowa
50–449 Wrocław, Podwale 75
e-mail: ¹ewa.zysk@interia.pl, ²panoch@pwwr.wroc.pl*

Słowa kluczowe: niedźwiedź brunatny, Karpaty, czynniki środowiskowe, wybiórczość żerowiskowa, ranienie drzew.

Abstrakt: Na obszarze polskiej części Karpat masowe ranienie drzew przez niedźwiedzie po raz pierwszy stwierdzono w 1991 roku w okolicach Dwernika Kamienia (Nadleśnictwo Lutowiska) i na Hyrlatej (Nadleśnictwo Cisna). Obecnie zjawisko to dotyczy zarówno wschodnio-, jak i zachodnio-karpackiej populacji niedźwiedzia brunatnego. W obserwacjach nad tym aspektem behawioru niedźwiedzia brunatnego interesujący wydaje się wpływ poszczególnych czynników biotycznych i abiotycznych na wybór przez te zwierzęta miejsc do żerowania oraz preferencje w odniesieniu do konkretnych gatunków drzew. W Bieszczadach, a także w Beskidzie Niskim najchętniej wybieranym przez niedźwiedzie gatunkiem jest jodła, w Tatrach oraz Beskidzie Żywieckim zaś – modrzew i świerk. Spośród drzew iglastych sosna jest najrzadziej wybierana przez niedźwiedzie w celu żerowania na jej łyku. Pojedyncze przypadki ranienia drzew tego gatunku spotyka się w Bieszczadach.