

Występowanie stokłosa spłaszczonej *Bromus carinatus* i kolczurki klapowanej *Echinocystis lobata* w Ojcowskim Parku Narodowym

Occurrence of *Bromus carinatus* and *Echinocystis lobata* in the Ojców National Park (southern Poland)

ANNA SOŁTYS-LELEK

Ojcowski Park Narodowy
32-047 Ojców 9
e-mail: ana_soltys@wp.pl

Słowa kluczowe: *Bromus carinatus*, *Echinocystis lobata*, kenofity, ekspansje, Ojcowski PN.

W pracy przedstawiono charakterystykę występowania dwóch gatunków obcego pochodzenia – stokłosa spłaszczonej *Bromus carinatus* Hook. & Arn. i kolczurki klapowanej *Echinocystis lobata* (F. Michx.) Torr. & A. Grey na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Stokłosa spłaszczona została sprowadzona do Polski jako trawa uprawna na początku lat 60. XX wieku, a kolczurka klapowana pojawiła się w naszym kraju już w latach 30. XX wieku jako roślina ozdobna. Na terenie Parku stokłosa spłaszczona została znaleziona na jednym, przydrożnym stanowisku, natomiast kolczurka klapowana na piętnastu rozproszonych wzdłuż doliny Prądnika.