

Ryjówkokszałtne i gryzonie Parku Narodowego Ujście Warty i terenów przyległych

Soricomorphs and rodents of the Ujście Warty National Park and the surrounding area

GRZEGORZ WOJTASZYN¹, TOMASZ RUTKOWSKI¹, GRZEGORZ LESIŃSKI², WOJCIECH STEPHAN¹,
MAGDALENA BARTOSZEWICZ³

¹ Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
60–788 Poznań, ul. Stolarska 7/3
e-mail: grzegwojt2@wp.pl, pardosa@gazeta.pl, wssteven@wp.pl

³ 66–436 Słońsk, ul. Szpitalna 2
e-mail: madzialena.b@wp.pl

² Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02–787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159C
e-mail: glesinski@wp.pl

Słowa kluczowe: Soricomorpha, Rodentia, drobne ssaki, dolina rzeczna, tereny zalewowe, zachodnia Polska.

W latach 1995–2014 w celu rozpoznania składu gatunkowego drobnych ssaków na obszarze Parku Narodowego Ujście Warty i terenów przyległych prowadzono badania za pomocą następujących metod: (1) odłowów w pułapki żywołowne na 18 stanowiskach, (2) analizy pokarmu norki amerykańskiej *Neovison vison* i szopa pracza *Procyon lotor* z terenu zalewowego Parku Narodowego (położonego w międzywalu Warty), (3) analizy pokarmu płomykówki *Tyto alba* z 7 stanowisk, (4) obserwacji oraz danych od innych osób. Łącznie stwierdzono 17 gatunków (5 z rzędu ryjówkokszałtnych Soricomorpha i 12 z rzędu gryzoni Rodentia). We wszystkich siedliskach wilgotnych obserwowano nornika północnego *Microtus oeconomus*, karczownika *Arvicola amphibius*, ryjówkę malutką *Sorex minutus* i rzęsorka rzeczka *Neomys fodiens*. Rzadko stwierdzano zębiełka karliczka *Crocidura suaveolens* i nornika burego *Microtus agrestis*. Wykazany skład gatunkowy jest charakterystyczny dla dolin rzecznych i zbliżony do występującego na innych obszarach o podobnym charakterze np. doliny Biebrzy.