

Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) kamieniołomu Zachełmie i terenów przyległych

Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) of the Zachełmie quarry and adjacent areas

EMILIA GRZĘDZICKA

*Instytut Ochrony Przyrody PAN
31–120 Kraków, al. A. Mickiewicza 33
e-mail: grzedzicka@iop.krakow.pl*

Słowa kluczowe: kamieniołom Zachełmie, Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea, *Phengaris alcon*, *Polyommatus bellargus*, *Lycaena dispar*.

Na obszarze rezerwatu przyrody „Zachełmie” i terenach przyległych prowadzono w latach 2008–2011 nieregularne obserwacje faunistyczne motyli dziennych (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea), a w latach 2012–2013 – badania na wyznaczonych transektach różniących się siedliskowo. Stwierdzono łącznie obecność 44 gatunków motyli, w tym: modraszka alkona *Phengaris alcon*, modraszka adonisa *Polyommatus bellargus* i czerwonończyka nieparka *Lycaena dispar*. Największe bogactwo gatunkowe motyli odnotowano w pobliżu wydeptanej ścieżki. Głównymi zagrożeniami dla występującej w kamieniołomie i jego otoczeniu fauny motyli dziennych są: presja turystyczna oraz zarastanie murawy kserotermicznej krzewami i drzewami.