

Wyniki wstępnych badań nad zróżnicowaniem fauny pszczół w rezerwacie stepowym „Góra Gipsowa” na Opolszczyźnie

Results of the preliminary studies of bee fauna diversity in the steppe reserve “Gipsowa Góra” in Opole province

JÓZEF BANASZAK*, LUCYNA TWERD, JAROSŁAW TWERD

Katedra Ekologii, Instytut Biologii Środowiska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85–830 Bydgoszcz, al. Ossolińskich 12
e-mail: *lednica@ukw.edu.pl; rawita@poczta.fm

Słowa kluczowe: owady zapylające, Apiformes, murawy kserotermiczne, rezerwat „Góra Gipsowa”, Brama Morawska.

Prezentowano wstępne wyniki badań prowadzonych w lipcu w latach 2008 i 2010 na terenie rezerwatu roślinności kserotermicznej „Góra Gipsowa” koło Kietrza na Opolszczyźnie, tuż przy granicy z Czechami. Lista Apiformes stwierdzonych w rezerwacie obejmuje 75 gatunków letnich. W zebranych materiałach stwierdzono 7 gatunków zagrożonych oraz 10 objętych ochroną prawną. Spośród wykazanych 14 to taksony o charakterze „południowym”, co stanowi niemal 19% odłowionych gatunków pszczół. Do taksonów tych należą: *Hylaeus paulus*, *H. difformis*, *H. punctatus*, *Andrena flavipes*, *A. floricola*, *Halictus sexcinctus*, *Seladonia subaurata*, *Lasioglossum quadrinotatum*, *Evylaeus nigripes*, *E. pauxillus*, *Rhopitoides canus*, *Rophites quinquespinosus*, *Anthidiellum strigatum*, *Anthophora bimaculata*. Uzyskane wyniki są wstępem do badań nad rolą Bramy Morawskiej w napływie fauny ciepłolubnej owadów zapylających na obszar Polski. Szlak ten jest obecnie najsłabiej rozpoznany.