

Stanowisko salamandry plamistej *Salamandra salamandra* w północnej części Pogórza Rożnowskiego

Occurrence of the fire salamander *Salamandra salamandra* in the northern Rożnów Foothills

KAROLINA A. BUDZIK¹, KRYSZTOF M. BUDZIK²

¹ Zakład Anatomii Porównawczej
Instytut Zoologii UJ
30–387 Kraków, ul. Gronostajowa 9

² Zakład Ekologii Roślin, Instytut Botaniki UJ
31–512 Kraków, ul. Lubicz 46
e-mail: krystian.budzik@uj.edu.pl

Słowa kluczowe: salamandra plamista, Pogórze Rożnowskie, liczebność larw.

Na Pogórzu Rożnowskim opisano stanowisko salamandry plamistej *Salamandra salamandra*. Obecność dorosłych osobników oraz ich larw stwierdzono w miejscowościach Pleśna i Lubinka, około 10 km na południe od Tarnowa. Dorosłe salamandry zamieszkują tamtejsze grądy i buczyny, a w potokach Pleśnianka i Lubinka płynących przez te zbiorowiska leśne samice rodzą larwy. W celu uzyskania pierwszych danych ilościowych w maju 2011 roku przeprowadzono liczenie larw salamandry w obu potokach na 14 transektach o długości 100 m każdy. W potoku Pleśnianka odnotowano łącznie 403 larwy tego gatunku, natomiast w potoku Lubinka ich liczba wynosiła 46. Uzyskane wyniki sugerują, że salamandra plamista na badanym terenie jest stosunkowo liczna, co potwierdzają częste obserwacje dorosłych osobników.